



Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane der Schweiz

Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons

Associazione svizzera degli organi ufficiali di controllo dei funghi

www.vapko.ch

Deutschschweiz

Schwarzblauerer Röhrling *Cyanoboletus pulverulentus*

Mitteilung zur Handhabung als Speisepilz

Barbara Zoller, Verbandstoxikologin VSVP



Cyanoboletus pulverulentus
Foto: Barbara Zoller

Ausgangslage

In einer Tschechischen Studie von 2018 wurden 39 Kollektionen von *Cyanoboletus pulverulentus* analysiert. Es konnte gezeigt werden, dass dieser Röhrling **Arsen unabhängig von der Bodenqualität** aus dem Substrat anreichern kann.

Ungefähr 80% der im Fruchtkörper angereicherten Arsenverbindung befindet sich laut Studie in der Fruchtschicht.

Empfohlene Massnahmen

Um die Sicherheit bei der Einnahme zu verbessern sollten die Sammlerinnen und Sammler wie folgt informiert werden:

Einnahmeempfehlung.

Der Schwarzblauende Röhrling darf weiterhin als Speisepilz freigegeben werden. Dabei sollte beachtet werden:

- Es wird empfohlen, pro Mahlzeit nicht mehr als 100g dieser Pilzart zu essen.
- Auf Grund der Anreicherung von Arsen in der Fruchtschicht soll die **Röhrenschicht entfernt werden.**
- Der Schwarzblauende Röhrling sollte pro Pilzsaison nur wenige Male als Speisepilz verwendet werden.